



REGIONE
LAZIO

ARSIAL
Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



ZONA MONITORAGGIO	AVVERSITA'	N. 1/2025	
Area 2: Corcolle	<i>Ceratitis capitata</i> (MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA)	dal	9/05/2025
		al	15/05/2025



Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Temperature variabili durante la settimana. Possibili piogge copiose.
Rilievo infestazione:	Monitoraggio effettuato su piante di pesco: rilevata presenza di due individui adulti.	

	PRESCRIZIONE	
Misure preventive	Cattura massale e applicazione della tecnica Attract and Kill con trappole o pannelli	
Misure di lotta	Intervenire alle prime catture con prodotti ammessi solo su cv inizio invaiatura al fine di limitare le prime generazioni dell'insetto e dopo aver accertato la presenza degli adulti mediante trappole di monitoraggio.	

LIMITARE IL TRATTAMENTO ALLE SOLE CV PRECOCI IN INVAIATURA

LOTTA INTEGRATA Trattamento chimico*	<i>Beauveria bassiana</i> (n.a), <i>Spinosad</i> (carenza 7 gg), <i>Lambdacialotrina</i> (carenza 7 gg), <i>Deltametrina</i> (carenza 3 gg), <i>Etofenprox</i> (carenza 7 gg), <i>Acetamiprid</i> (carenza 14 gg), Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina.
LOTTA BIOLOGICA Trattamento biologico	<i>Spinosad</i> , <i>Beauveria bassiana</i> , Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina.

ATTENZIONE

La somma dei trattamenti annuali con piretrine, piretroidi ed etofenprox è di 5 interventi/anno; tra questi si possono eseguire al massimo: 2 interventi/anno con etofenprox e 1 con lambdacialotrina. Con Acetamiprid, al massimo 2 interventi. Con Spinosad al massimo 4 interventi all'anno solo per la lotta adulticida in formulazioni con esca NB. Si riportano le indicazioni tratte dalle: LINEE GUIDA NAZIONALI DIFESA INTEGRATA 2025 - PARTE SPECIALE.

con il supporto tecnico-scientifico di:

CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura, sede di Roma