



REGIONE  
LAZIO

ARSIAL  
Agenzia Regionale  
per lo Sviluppo e l'Innovazione  
dell'Agricoltura del Lazio



| ZONA MONITORAGGIO                                          | AVVERSITA'                                                     | N. 19/2025 |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Area 1: Paliano, Carchitti, Colonna, San Cesareo, Zagarolo | <i>Ceratitis capitata</i><br>(MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA) | Dal        | 17/09/2025 |
|                                                            |                                                                | Al         | 23/09/2025 |



|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilevo infestazione: | Monitoraggio effettuato su piante di pesco: <b>rilevata presenza di n. 1378 individui</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>PRESCRIZIONE</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Misure preventive | Cattura massale e applicazione della tecnica Attract and Kill con trappole o pannelli                                                                                                                                    |
| Misure di lotta   | Intervenire alle prime catture con prodotti ammessi solo su cv inizio invaiatura al fine di limitare le prime generazioni dell'insetto e dopo aver accertato la presenza degli adulti mediante trappole di monitoraggio. |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRATTARE LE CV INVAIATE</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LOTTA INTEGRATA</b><br>Trattamento chimico*  | <i>Beauveria bassiana</i> (n.a), <i>Spinosad</i> (carenza 7 gg), <i>Lambdacialotrina</i> (carenza 7 gg), <i>Deltametrina</i> (carenza 3 gg), <i>Etofenprox</i> (carenza 7 gg), <i>Acetamiprid</i> (carenza 14 gg), <b>Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina.</b> |
| <b>LOTTA BIOLOGICA</b><br>Trattamento biologico | <i>Spinosad</i> , <i>Beauveria bassiana</i> , <b>Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina.</b>                                                                                                                                                                      |

#### ATTENZIONE

La somma dei trattamenti annuali con piretrine, piretroidi ed etofenprox è di 5 interventi/anno; tra questi si possono eseguire al massimo: 2 interventi/anno con etofenprox e 1 con lambdacialotrina. Con Acetamiprid, al massimo 2 interventi. Con Spinosad al massimo 4 interventi all'anno solo per la lotta adulticida in formulazioni con esca NB. Si riportano le indicazioni tratte dalle: LINEE GUIDA NAZIONALI DIFESA INTEGRATA 2025 - PARTE SPECIALE.

con il supporto tecnico-scientifico di:

**CREA**

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e  
Agrumicoltura, sede di Roma