



REGIONE  
LAZIO

ARSIAL  
Agenzia Regionale  
per lo Sviluppo e l'Innovazione  
dell'Agricoltura del Lazio



| ZONA MONITORAGGIO                                          | AVVERSITA'                                                     | N. 22/2025 |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Area 1: Paliano, Carchitti, Colonna, San Cesareo, Zagarolo | <i>Ceratitis capitata</i><br>(MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA) | Dal        | 08/10/2025  |
|                                                            |                                                                | Al         | 014/10/2025 |



|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rilievo infestazione: | Monitoraggio effettuato su piante di pesco: <b>rilevata presenza di 83 individui/trappola</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   | PRESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure preventive | Cattura massale e applicazione della tecnica Attract and Kill con trappole o pannelli                                                                                                                                    |
| Misure di lotta   | Intervenire alle prime catture con prodotti ammessi solo su cv inizio invaiatura al fine di limitare le prime generazioni dell'insetto e dopo aver accertato la presenza degli adulti mediante trappole di monitoraggio. |

## NESSUNA PRESCRIZIONE, LE OPERAZIONI DI RACCOLTA SONO TERMINATE

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOTTA INTEGRATA<br>Trattamento chimico*  | <i>Beauveria bassiana</i> (n.a), Spinosad (carenza 7 gg), Lambdacialotrina (carenza 7 gg), Deltametrina (carenza 3 gg), Etofenprox (carenza 7 gg), Acetamiprid (carenza 14 gg), Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina. |
| LOTTA BIOLOGICA<br>Trattamento biologico | Spinosad, <i>Beauveria bassiana</i> , Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina.                                                                                                                                           |

### ATTENZIONE

La somma dei trattamenti annuali con piretrine, piretroidi ed etofenprox è di 5 interventi/anno; tra questi si possono eseguire al massimo: 2 interventi/anno con etofenprox e 1 con lambdacialotrina. Con Acetamiprid, al massimo 2 interventi. Con Spinosad al massimo 4 interventi all'anno solo per la lotta adulticida in formulazioni con esca NB. Si riportano le indicazioni tratte dalle: LINEE GUIDA NAZIONALI DIFESA INTEGRATA 2025 - PARTE SPECIALE.

con il supporto tecnico-scientifico di:

**CREA**

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e  
Agrumicoltura, sede di Roma