REGIONE LAZIO

ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

ZONA MONITORAGGIO	AVVERSITA'	N. 7/2025	
Area 3: Palombara Sabina, Montelibretti, Moricone	*Ceratitis capitata* (MOSCA MEDITERRANEA DELLA FRUTTA)	dal	19/06/2025
		al	25/06/2025

Rilievo infestazione:	Monitoraggio effettuato su piante di pesco: **67 adulti**

	PRESCRIZIONE
Misure preventive	Cattura massale e applicazione della tecnica Attract and Kill con trappole o pannelli
Misure di lotta	Intervenire alle prime catture con prodotti ammessi solo su cv inizio invaiatura al fine di limitare le prime generazioni dell'insetto e dopo aver accertato la presenza degli adulti mediante trappole di monitoraggio.

TRATTARE LE CV. INVAIATE E QUELLE PROSSIME ALL'INVAIATURA

LOTTA INTEGRATA **Trattamento chimico***	***Beauveria bassiana*** (n.a)**, Spinosad** (carenza 7 gg)**, Lambdacialotrina** (carenza 7 gg)**, Deltametrina** (carenza 3 gg)**, Etofenprox** (carenza 7 gg)**, Acetamiprid** (carenza 14 gg), **Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina.**
LOTTA BIOLOGICA **Trattamento biologico**	**Spinosad, *Beauveria bassiana,* Attract and Kill con Lambdacialotrina e pannelli attrattivi con Deltametrina.**

ATTENZIONE

La somma dei trattamenti annuali con piretrine, piretroidi ed Etonfenprox è di 5 interventi/anno; tra questi si possono eseguire al massimo: 2 interventi/anno con Etofenprox e 1 con Lambdacialotrina. Con Acetamiprid, al massimo 2 interventi. Con Spinosad al massimo 4 interventi all'anno solo per la lotta adulticida in formulazioni con esca
NB. Si riportano le indicazioni tratte dalle: LINEE GUIDA NAZIONALI DIFESA INTEGRATA 2025 - PARTE SPECIALE.

con il supporto tecnico-scientifico di:

CREA
Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Roma