




Bollettino fitosanitario cimice asiatica

Settimana 10.07.2026

Nel contesto delle attività previste per il contrasto della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), in collaborazione con il Coordinamento Corilicolo Territoriale della Regione Lazio, è prevista la redazione e pubblicazione dei bollettini fitosanitari. Il territorio interessato dalle maggiori estensioni di nocciolo è stato suddiviso in 5 zone in base alle condizioni pedoclimatiche. Nella mappa sotto riportata sono indicate le posizioni delle trappole dedicate al monitoraggio della *Halyomorpha halys*. Il dato pubblicato per ogni zona, deriva dalla media delle catture settimanali all'interno dell'area di riferimento.

Tutte le attività di monitoraggio (gestione trappole, disponibilità dei siti, acquisto trappole, ecc...) sono effettuate in stretta collaborazione tra i soggetti partner istituzionali ARSIAL, ENEA, UNITUS, Regione Lazio, Servizio Fitosanitario ed il CCT, in particolare si ringraziano: C.P.N, Euronocciola, Assofrutti, Domus Nocum, Helix Soc. Agr. per la partecipazione attiva a tutte le fasi dell'attività.



Il bollettino indica l'andamento della popolazione di cimice asiatica nei 5 areali, e in associazione alle attività di frappe, alla valutazione delle condizioni climatiche e dello stadio fenologico della coltura, monitorati dai singoli agricoltori, agevola la scelta del momento idoneo ad effettuare gli interventi fitosanitari.



**REGIONE
LAZIO**

ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA**




ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da clima eccezionalmente caldo con temperature massime che hanno toccato picchi di 35 gradi, cieli soleggiati e stabilità prevalente con sporadici ma intensi temporali pomeridiani.


In linea con le attività di contrasto alla cimice asiatica messe in atto a livello Regionale, a distanza di 20 giorni dal primo lancio, è in corso la seconda tranche di lanci presso i siti individuati e giudicati idonei.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Viterbo Nord



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area Nord alla 12° settimana di monitoraggio si rileva una stabilizzazione della popolazione con un basso numero di catture relativamente a tutte gli stadi monitorati. Anche il dato relativo alle catture delle forme giovanili, che appariva in crescita fino al rilievo dell'undicesima settimana, risulta ridimensionato (da verificare con osservazioni di campo e futuri monitoraggi).


Stato fenologico rilevato: accrescimento frutti. Potenziale suscettibilità ad aborto traumatico.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Monti Cimini



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area dei Monti Cimini alla 12° settimana di monitoraggio si constata una sostanziale stabilizzazione della popolazione adulta, si rileva al contempo un'importante crescita degli individui giovani al III stadio di sviluppo.

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Est



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area Est alla 12ª settimana di monitoraggio si constata una crescita della popolazione adulta, importante anche la presenza di individui giovani, in particolare neanidi di III stadio che raddoppiano rispetto alla precedente settimana.

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Ovest



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area Ovest alla 12° settimana di monitoraggio la popolazione adulta rilevata è quasi azzerata, non si rilevano individui giovani nell'area.

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Lago di Vico



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area dei Monti Cimini alla 12° settimana di monitoraggio si constata un visibile incremento della popolazione adulta, non si rilevano individui giovani ma si segnalano le frequenti ovature su nocioleti e vegetazione spontanea.

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.