


Settimana 24.07.2026

Nel contesto delle attività previste per il contrasto della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), in collaborazione con il Coordinamento Corilicolo Territoriale della Regione Lazio, è prevista la redazione e pubblicazione dei bollettini fitosanitari. Il territorio interessato dalle maggiori estensioni di nocciolo è stato suddiviso in 5 zone in base alle condizioni pedoclimatiche. Nella mappa sotto riportata sono indicate le posizioni delle trappole dedicate al monitoraggio della *Halyomorpha halys*. Il dato pubblicato per ogni zona, deriva dalla media delle catture settimanali all'interno dell'area di riferimento.

Tutte le attività di monitoraggio (gestione trappole, disponibilità dei siti, acquisto trappole, ecc...) sono effettuate in stretta collaborazione tra i soggetti partner istituzionali ARSIAL, ENEA, UNITUS, Regione Lazio, Servizio Fitosanitario ed il CCT, in particolare si ringraziano: C.P.N, Euronocciola, Assofrutti, Domus Nocum, Helix Soc. Agr. per la partecipazione attiva a tutte le fasi dell'attività.



Il bollettino indica l'andamento della popolazione di cimice asiatica nei 5 areali, e in associazione alle attività di frappe, alla valutazione delle condizioni climatiche e dello stadio fenologico della coltura, monitorati dai singoli agricoltori, agevola la scelta del momento idoneo ad effettuare gli interventi fitosanitari.



REGIONE
LAZIO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA




Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da clima eccezionalmente caldo con temperature massime che hanno toccato picchi di 35 gradi, soprattutto nella prima delle due settimane, cieli soleggiati e stabilità prevalente con sporadici ma intensi temporali pomeridiani.


In linea con le attività di contrasto alla cimice asiatica messe in atto a livello Regionale, le attività di lancio dell'antagonista naturale *Trissolcus japonicus* sono state completate su tutti i siti individuati idonei. Procedono i monitoraggi in campo mediante trappole e campionamento visivo.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Viterbo Nord



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area Nord alla 14ª settimana di monitoraggio si rileva una stabilizzazione della popolazione adulta con un basso numero di catture. Il dato relativo alle catture delle forme giovanili, che appariva in decrescita alla dodicesima settimana, risulta in aumento.


Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Monti Cimini



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area dei Monti Cimini alla 14° settimana di monitoraggio si rileva una stabilizzazione della popolazione adulta con un basso numero di catture. Il dato relativo alle catture delle forme giovanili, resta in linea con le catture dell'undicesima e dodicesima settimana.

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Est



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area Est alla 14° settimana di monitoraggio si constata una stabilizzazione delle popolazioni, con particolare attenzione alla popolazione giovanile: Neanidi di III stadio sempre presenti e ampiamente rappresentate nelle ultime settimane

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Ovest



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area Ovest alla 14ª settimana di monitoraggio la popolazione adulta rilevata è azzerata, non si rilevano individui giovani nell'area.

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Lago di Vico



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area dei Monti Cimini alla 14° settimana, si constata un leggero incremento della popolazione adulta e un decremento della neanidi di III stadio. Si segnala il mancato monitoraggio alla 13° settimana.

Stato fenologico rilevato: termine accrescimento frutti.

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.