




Bollettino fitosanitario cimice asiatica

Settimana 28.08.2026

Nel contesto delle attività previste per il contrasto della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), in collaborazione con il Coordinamento Corilicolo Territoriale della Regione Lazio, è prevista la redazione e pubblicazione dei bollettini fitosanitari. Il territorio interessato dalle maggiori estensioni di nocciolo è stato suddiviso in 5 zone in base alle condizioni pedoclimatiche. Nella mappa sotto riportata sono indicate le posizioni delle trappole dedicate al monitoraggio della *Halyomorpha halys*. Il dato pubblicato per ogni zona, deriva dalla media delle catture settimanali all'interno dell'area di riferimento.

Tutte le attività di monitoraggio (gestione trappole, disponibilità dei siti, acquisto trappole, ecc...) sono effettuate in stretta collaborazione tra i soggetti partner istituzionali ARSIAL, ENEA, UNITUS, Regione Lazio, Servizio Fitosanitario ed il CCT, in particolare si ringraziano: C.P.N, Euronocciola, Assofrutti, Domus Nocum, Helix Soc. Agr. per la partecipazione attiva a tutte le fasi dell'attività.



Il bollettino indica l'andamento della popolazione di cimice asiatica nei 5 areali, e in associazione alle attività di frappe, alla valutazione delle condizioni climatiche e dello stadio fenologico della coltura, monitorati dai singoli agricoltori, agevola la scelta del momento idoneo ad effettuare gli interventi fitosanitari.



REGIONE
LAZIO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA




Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da clima eccezionalmente caldo con temperature massime che hanno toccato picchi di 35 gradi, cieli soleggiati e stabilità prevalente con sporadici ma intensi temporali pomeridiani. Tutto il mese di agosto ha registrato temperature media al di sopra delle attese stagionali.

In linea con le attività di contrasto alla cimice asiatica messe in atto a livello Regionale, le attività di lancio dell'antagonista naturale *Trissolcus japonicus* sono state completate su tutti i siti individuati idonei. Procedono i monitoraggi in campo mediante trappole e campionamento visivo. Sulle aree non interessate dal lancio del parassitoide le attività di monitoraggio sono state momentaneamente sospese.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Viterbo Nord



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area Nord alla 19ª settimana di monitoraggio si rileva un picco della popolazione giovane (neanidi di III età) dopo settimane relativamente stabili, il dato relativo alla popolazione adulta, eccezion fatta per la settimana precedente, risulta stabile. Si evidenzia che le settimane del 7 e 14 Agosto riportano dati pari a 0 per una momentanea sospensione del monitoraggio.

Stato fenologico rilevato: completo sviluppo del frutto


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Monti Cimini



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)




Nell'area denominata Monti Cimini alla 19ª settimana di monitoraggio si rileva una presenza importante di individui giovani. Le catture di individui adulti si attestano a 14 cimici, dato in linea con la media delle ultime settimane. Si evidenzia che la settimana del 14 Agosto riporta dati pari a 0 per una momentanea sospensione del monitoraggio.

Stato fenologico rilevato: competo sviluppo del frutto


Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.

Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Est



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area Est alla 19° settimana di monitoraggio si registrano numeri elevati relativamente agli giovani (neanidi di III età); la popolazione adulta è in lieve crescita ma in linea con l'andamento generale: 20 individui circa. Nel mese di agosto si segnala un picco di catture alla prima settimana di monitoraggio. Si evidenzia che la settimana del 14 Agosto riporta dati pari a 0 per una momentanea sospensione del monitoraggio.


Stato fenologico rilevato: competo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Ovest



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Momentanea sospensione delle attività di monitoraggio a partire da agosto.


Stato fenologico rilevato: completo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Lago di Vico



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Momentanea sospensione delle attività di monitoraggio a partire da agosto.

Stato fenologico rilevato: competo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.