

Il bollettino indica l'andamento della popolazione di cimice asiatica nei 5 areali, e in associazione alle attività di frappe, alla valutazione delle condizioni climatiche e dello stadio fenologico della coltura, monitorati dai singoli agricoltori, agevola la scelta del momento idoneo ad effettuare gli interventi fitosanitari.



REGIONE
LAZIO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA




Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da clima caldo, con temperature ancora al di sopra delle medie stagionali, seppur con un riadeguamento dei valori soprattutto a partire dalla seconda settimana del mese. Sono stati registrati sporadici ma intensi temporali.

In linea con le attività di contrasto alla cimice asiatica messe in atto a livello Regionale, le attività di lancio dell'antagonista naturale *Trissolcus japonicus* sono state completate su tutti i siti individuati idonei. Procedono i monitoraggi in campo mediante trappole e campionamento visivo. Sulle aree non interessate dal lancio del parassitoide le attività di monitoraggio sono state momentaneamente sospese.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Viterbo Nord



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area Nord alla 21ª settimana di monitoraggio si rileva una bassa e stabile presenza di individui adulti, resta alta la presenza di neanidi di III età, dato ancora più evidente nella due settimane precedenti.


Stato fenologico rilevato: competo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Monti Cimini



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area denominata Monti Cimini alla 21ª settimana di monitoraggio ed in particolare nelle ultime 4 settimane si registra una curva crescente degli individui adulti. Appare nettamente ridimensionata la popolazione giovane con poche catture per trappola.


Stato fenologico rilevato: competo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Est



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Nell'area Est alla 21ª settimana di monitoraggio si registrano numeri relativamente elevati, ma stabili, con circa 20 catture di individui adulti; dati simili si registrano per gli individui giovani, in particolare neanidi di III età.


Stato fenologico rilevato: completo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Ovest



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Momentanea sospensione delle attività di monitoraggio a partire da agosto.


Stato fenologico rilevato: completo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.




Andamento delle catture di Cimice Asiatica

Zona Lago di Vico



Individui monitorati: **adulti** e **neanidi IV stadio** (n. medio catture/trappola/settimana)



Momentanea sospensione delle attività di monitoraggio a partire da agosto.

Stato fenologico rilevato: competo sviluppo del frutto

Si consiglia il monitoraggio mediante campionamento visivo della vegetazione e attività di "frappage" su colture idonee.